

АКТОВЕГИН®

Аптека в одном препарате!

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ*(1):

Цереброваскулярных заболеваниях
Диабетической полинейропатии
Хронической венозной недостаточности
Хронических облитерирующих
заболеваниях артерий нижних конечностей

ПРЕИМУЩЕСТВА (5-8):

Регресс заболеваний (5,6,7,8)
Стойкий эффект (5,6)
Благоприятный профиль безопасности (5,6,7)



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

ДЕЙСТВИЯ:



ЭНДОТЕЛИОПРОТЕКТИВНОЕ®



АНТИГИПОКСАНТНОЕ®



МЕТАБОЛИЧЕСКОЕ®



Торговое наименование: Актовегин®. **Активное вещество:** депротеинизированный гемодериват крови телят. **Лекарственная форма:** раствор для инъекций, таблетки покрытые оболочкой

Показания к применению. В составе комплексной терапии: • Симптоматическое лечение когнитивных нарушений, включая постинсультные когнитивные нарушения и деменцию. • Симптоматическое лечение нарушений периферического кровообращения и их последствий. • Симптоматическое лечение диабетической полинейропатии (ДПН). **Противопоказания.** Для инъекций: Гиперчувствительность к препарату Актовегин® и аналогичным препаратам или вспомогательным веществам. Декомпенсированная сердечная недостаточность, отек легких, олигурия, анурия, задержка жидкости в организме. Детский возраст до 18 лет. Для таблеток: Гиперчувствительность к препарату Актовегин® и аналогичным препаратам или вспомогательным веществам. Непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция или сахарозо-изомальтозная недостаточность. Детский возраст до 18 лет. **С осторожностью:** Беременность и период грудного вскармливания. **Способ применения и дозы.** Постинсультные когнитивные нарушения В остром периоде ишемического инсульта, начиная с 5 - 7 дня, по 2000 мг в сутки внутривенно капельно до 20 инфузий с переходом на таблетированную форму по 2 таблетки 3 раза в день (1200 мг/день). Общая продолжительность лечения 6 месяцев. Деменция По 2000 мг в сутки внутривенно капельно до 4 недель или по 1200мг/день внутрь до 20 недель.

Нарушения периферического кровообращения и их последствия По 800 - 2000 мг в сутки внутриаартерально или внутривенно капельно до 4 недель или по 600-1200 мг/день внутрь от 4 до 6 недель. Для лечения пациентов с хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей IVB стадии по Фонтейну были изучены эффективность и безопасность применения препарата по 1200 мг внутривенно капельно в течение 2 недель с последующим переходом на таблетированную форму по 1-2 таблетки 3 раза в день до 10 недель. Диабетическая полинейропатия По 2000 мг в сутки внутривенно капельно 20 инфузий с переходом на таблетированную форму по 3 таблетки 3 раза в день (1800 мг/день) продолжительностью от 4 до 5 месяцев. **Побочное действие.** Аллергические реакции (в том числе крапивница, внезапное покраснение) вплоть до анафилактического шока; миалгия (только для инъекционной формы). **Полная информация по препарату содержится в инструкции по применению.**

АКТОВЕГИН®

Аптека в одном препарате!

ПРИМЕНЕНИЕ В НЕВРОЛОГИИ

Рекомендуется проводить минимум 2 курса в год

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:



neurologia.info

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ



СМОТРИТЕ
ВИДЕО-ЛЕКЦИИ



УЧАСТВУЙТЕ
В ОБСУЖДЕНИЯХ



ЧИТАЙТЕ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ
ОБЗОРЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

* ЦВЗ, сопровождающиеся когнитивными нарушениями. Хроническая венозная недостаточность и Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей — нарушения периферического кровообращения и их последствия. 1. Инструкция по медицинскому применению препарата Актовегин®. 2. Fedorovich A.A. Microvasc Res. 2012;84(1):66-93. 3. Machado F et al. J Neurol Sci. 2012;322(1-2):222-7. 4. Elminger MW et al. Neuromolecular Med. 2011. 5. Guekht A et al. Stroke. 2017; 48(5): 1262-1270. 6. CLINICAL STUDY REPORT Actovegin-3001; 2020; NCT03469349. 7. Ziegler D. et al. Diabetes Care 2009;32(8):1479-1484. 8. Учкин А.Г. и др. РМЖ 2007; 15(12):981-985. 9. Куташов В.А. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2021;13(2):65-72. 10. Ковальчук В.В. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2021; 13(1):57-66. 11. Letzel H. et al. Therapiewoche 1984;34:5280-5290. C-APROM/RUIAVG/0472

НОЗОЛОГИЯ

СХЕМА ТЕРАПИИ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

Когнитивные нарушения,
в том числе деменция

400 мг 
3 раза в день

до 5 месяцев

Первые улучшения
когнитивного статуса
по MoCA-тесту через
1,5 месяца⁽¹¹⁾

(когнитивные нарушения,
в том числе после
перенесенного COVID-19^(9,10))

Постинсультные
когнитивные
нарушения

400 мг 
3 раза в день

до 6 месяцев

Уменьшение
симптомов ХИМ
к 6 неделе лечения⁽⁵⁾

Диабетическая
полинейропатия

600 мг 
3 раза в день

до 5 месяцев

Изменение по шкале
TSS на 7 неделе⁽⁷⁾